



La fiche de vulgarisation à l'usage des producteurs



LA CULTURE DU PETIT POIS

COMMENT FERTILISER

COMBIEN ?

QUAND ?

COMMENT ?

Le chaulage en cas du sol acide



Utilisez 30 kg de chaux fine et sèche / are tous les deux ans.

Au moins 4 semaines avant le semis.

Epandage homogène à la volée et enfouissement direct.

La fumure organique



Laissez les débris végétaux.

A la récolte.


Compostage ou Enfouissement lors du prochain labour.

Utilisez 100 kg/are = 4 paniers remplis de fumier ou compost bien décomposé.

Au moment de l'égalisation.

Epandage et enfouissement.

Engrais minéraux



Utilisez 1 kg de DAP/are.




Au moment du semis.

Epandage et enfouissement direct avant le semis.

1 are = 10 m x 10 m

La fiche de vulgarisation à l'usage des producteurs

LES PRINCIPALES MALADIES ET RAVAGEURS DU PETIT POIS

MALADIES	SYMPTOMES	PREVENTION	TRAITEMENT/PRODUITS	DOSES RECOMMANDEES
Le mildiou du petit pois		<ul style="list-style-type: none">- Utilisez les semences de qualité;- Faites une bonne rotation des cultures : le petit pois ne doit pas succéder au soja, au haricot, au pois cajan, à l'arachide, au niébé ou au petit pois.	Fongicide : Benlate	20 gr dans 10 litres d'eau par are
L'antracnose du petit pois		<ul style="list-style-type: none">- Utilisez les semences de bonne qualité;- Détruisez les débris de récolte ;- Faites une bonne rotation des cultures : le petit pois ne doit pas succéder au soja, au haricot, au pois cajan, à l'arachide, au niébé ou au petit pois.	Fongicide : Benlate	20 gr dans 10 litres d'eau par are
La chenille défoliante du petit pois		<ul style="list-style-type: none">- Enfouissez rapidement et profondément les débris de culture après la récolte	Insecticide : Diméthoate	10 ml (2 bouchons de Fanta) dans 10 litres d'eau par are

1 are = 10 m x 10 m