



Daftari ya uhimizaji kwa manufaa ya walimaji



MLIMO WA MHINDI

NAMNA YA KUWEKA SAMADI

KIASI GANI ?

WAKATI GANI ?

NAMNA GANI ?

Kutia chokaa ikiwa udongo ni mchachu (sol acide)



Tumia 30 kg ya chokaa laini na kavu kwa **are moja** kila myaka miwili

Sawa juma 4 kabla ya kupanda

Kusambarisha bila kubagua na kufunika mara moja

Mboleo ya kawaida ya kimazingira



Acha masalio ya mavuno shambani

Wakati wa kuvuna

Fanya Komposta au uizike wakati ya kutipulia kilimo kingine

Tumia 100 kg/are = vitunga 4 vilivyo jaa takataka au mboleo ya komposta iliyooza

Wakati wa kusawazisha

Kusambarisha kufunika mara moja

Samadi ya kuzikwa udongoni



Tumia 2,5 kg ya NPK 17-17-17/are au 1 kg ya DAP kwa are

Wakati wa kupada

Kusambarisha au kuzika shimoni(kufunika mboleo na udongo mbele ya mbegu).

Samadi ya kutandaza



Tumia 1 kg ya Urée kwa are





Baada ya kupalilia ya kwanza, mmea una urefu kati ya 30 na 40 cm.

Katika njia katikati ya mituta ya mihindi.

1 are = 10 m x 10 m

Daftari ya uhimizaji kwa manufaa ya walimaji

ADUI NA MAGONJWA MAALUM ZA MIHINDI

MAGONJWA	DALILI	NAMNA YA KUZUIA	TIBA / DAWA	KIASI CHA DAWA KINACHOAGIZWA
nyungunyungu (vidudu vilavyo majani)		<ul style="list-style-type: none"> - Heshimu siku za kupanda ; - Usibananishe mimea kupita kiasi ; - Fanya mzunguko mzuri: mihindi isifuatishwe ngano, ao mtama ao mihindi ; - Fyeka pori kando ya shamba ; - Fyeka na kuzika mimea ilioambukizwa. 	Insecticides : Diméthoate 40 % EC. ao Dursban 45 % EC	10 ml (simbi 2 za Fanta) ndani ya litri 10 za maji/are,
Helminthosporiose ao Kulungula		<ul style="list-style-type: none"> - Heshimu siku za kupanda ; - Tumia mbegu bora ; - Sawiri mbegu ukitumia Cérésan. 	Fongicide : Sawiri mbegu ukitumia Cérésan	20 gr za Céresan kwa 7 kg ya mbegu
Kutu		<ul style="list-style-type: none"> - Fanya mzunguko mzuri: mihindi isifuatishwe ngano, ao mtama ao mihindi; - Tumia takataka iliyooza kabisa; - Tumia mbegu bora; - Sawiri mbegu ukitumia Bénomyl. - Panda mbegu kdani ya mituta isiyobanana 	Fongicide : Tunza ukitumia Bénomyl	20 gr de Bénomyl dans 1 kg de semences
Viroboto vya mhindi		<ul style="list-style-type: none"> - Anza kilimo (kupanda) mapema 	Insecticide : Tunza ukitumia Diméthoate ao Cyperméthrine	10 ml (simbi 2 za Fanta) ndani ya litri 10 za maji/are.

1 are = 10 m x 10 m